



# କୋଭିଡ୍-୧୯ ପାଇଁ ଘରେ ପୃଥକ ବାସ ଓ ସମ୍ଭାଳ

(୦୫.୦୧.୨୦୨୨) ରେ ସଂଶୋଧିତ

Asymptomatic (ଲକ୍ଷଣ ବିହୀନ) ବ୍ୟକ୍ତି ୭ ଦିନ ପାଇଁ ଗୃହରେ ପୃଥକ ବାସ ରୁହନ୍ତୁ

Symptomatic (ଲକ୍ଷଣ ଯୁକ୍ତ) ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯଦି ୩ ଦିନ ଧରି ଜ୍ୱର ଲାଗିରହେ, ତେବେ କୋଭିଡ୍ ପରୀକ୍ଷା କରି ୭ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୃହରେ ପୃଥକ ବାସ ରୁହନ୍ତୁ

- ପରିବାରରେ ଯେଉଁ ସଦସ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରି ନେବା ଉଚିତ୍ ।
- ଲକ୍ଷଣ ନ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିଲେ ପରୀକ୍ଷା ବାଧ୍ୟ ନୁହେଁ ।

## କୋଭିଡ୍-୧୯ ର ସମ୍ପର୍କ ରୋଗୀ

ନିମ୍ନରେ ଥିବା କୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ଅନୁଭବ ହେଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା, ଆରଏଚି, ଆର୍ଟି-ପିସିଆର, କରନ୍ତୁ । ପୁନଃ ପରୀକ୍ଷଣର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ।

ଜ୍ୱର      କାଶ      ମୁଣ୍ଡବ୍ୟଥା      ତଣ୍ଡି ଦରଜ ଲାଗିବା

ଶରୀର ବ୍ୟଥା      ଅଣ ନିଃଶ୍ୱାସୀ ଲାଗିବା

ନିକଟରେ ଶ୍ୱାସିତା ଶକ୍ତି କମ୍ ହୋଇଥିବା      ନିକଟରେ ସ୍ୱାଦ ଶକ୍ତି କମ୍ ହୋଇଥିବା

ନିକଟର ଯଦୁ ନେଉଥିବା ବେଳେ ନିମ୍ନ ଲିଖିତ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ

- ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରା
- ଯଦି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସାତୁରେସର୍ ବା ପରିପୁର୍ଣ୍ଣତା ୯୩% ବା ତା'ଠାରୁ କମ୍ ହୁଏ ଚିକିତ୍ସାକ୍ରମରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ନିଜ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ସଂପର୍କ କରନ୍ତୁ
- ମଧୁମେହ ଓ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ପିଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଔଷଧ ସେବନ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ

### କରନ୍ତୁ

ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ      ହାତ ଧୁଅନ୍ତୁ      ଅଲଗା ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଆରାମ କରନ୍ତୁ

ପରିବାରର ସବୁ ସଦସ୍ୟ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ      କୋଠରୀରେ ବାୟୁ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ଝରକା ଖୋଲା ରଖନ୍ତୁ

ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରା (ପ୍ରତ୍ୟେକ ୬ ଘଣ୍ଟାରେ)      ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣତା (ଅକ୍ସିମିଟର ସାହାଯ୍ୟରେ) (ପ୍ରତ୍ୟେକ ୬ ଘଣ୍ଟାରେ)

ଏହି ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ବି ହେଲେ ଡାକ୍ତରୀ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ

- ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣତା ୯୩% ବା ତା'ଠାରୁ କମ୍
- ଅଣନିଃଶ୍ୱାସୀ ଲାଗିଲେ ବା ମୁଣ୍ଡ ଘୁରାଇଲେ
- ୧୦୦° ରୁ ଅଧିକ ଜ୍ୱର ୩ ଦିନ ଲାଗି ରହିଲେ

### ଉପରୁ

ପାଣି, ସୁଦ୍, କୁସ୍, ପଇତ୍ ପାଣି, ଭଜ୍ୟାଦି ପିଅନ୍ତୁ      ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣତାକୁ ଆହୁରି ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ସେଟେଲ ଶୋଇ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଲମ୍ବା ନିଃଶ୍ୱାସ ନିଅନ୍ତୁ

୬ ଘଣ୍ଟା ବ୍ୟବଧାନରେ ପାରାସିଟାମଲ୍ ଏବଂ ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ତେବେ କଫ୍ ସିରପ୍ ନିଅନ୍ତୁ      ଦିନରେ ତିନି ଥର ବାମ୍ପ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ବା ଉଷୁମ ପାଣିରେ କୁଳି କରନ୍ତୁ

### କରନ୍ତୁ ନାହିଁ

- ଘରୋଇ ଚିକିତ୍ସାରେ ରେମ୍‌ଡେସିଭିଭର୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ
- ବୁଡ଼େସୋନାଇଡ୍ ପାଇଁ ନେଚ୍ୟୁଲାଇଜର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ
- ଡାକ୍ତରଙ୍କ ବିନା ପରାମର୍ଶରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସିଲିଣ୍ଡର୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ
- ଡାକ୍ତରଙ୍କ ବିନା ପରାମର୍ଶରେ ସିଟି ସ୍କାନ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ

### ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତୁ

- ମାପିତ ମାତ୍ରା ଇନ୍‌ହେଲର୍ (MDI)/ଶୁଖିଲା ପାଉଡର୍ ଇନ୍‌ହେଲର୍ (DPI) ଦ୍ୱାରା ବୁଡ଼େସୋନାଇଡ୍- ଯଦି ଲକ୍ଷଣ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପରେ ବି ରୁହେ, କେବଳ ତେବେ ହିଁ ନେବେ
- ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍, ଯେପରି ଉପଯୁକ୍ତ

ଏହା ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଶୀଳ ଦସ୍ତାବିଜ । ବିଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରମାଣ ଆଧାର ଉପରେ ଏହା ବଦଳି ଯାଇପାରେ ।

ଏମ୍‌ସ୍/ଆଇ.ସି.ଏମ୍.ଆର୍-କୋଭିଡ୍-୧୯ କାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ବଳ/ ସଂଯୁକ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ ସମୂହ (ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ) ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଭାରତ ସରକାର